

# 중증열성혈소판감소증후군 예방합시다!



SFTS 바이러스를 가지고 있는 **참진드기**에 물려서 발생하며 특히, 70세 이상 고연령층은 **사망률이 매우 높습니다.**

\*중증열성혈소판감소증후군(SFTS) : 바이러스에 의해 감염되며, 주로 작은소피참진드기가 매개하는 질병

## 주요증상



※특별한 치료제와 예방접종이 없으므로 진드기에 물리지 않는 것이 가장 중요합니다.

## 예방 및 관리수칙

- 야외활동 및 농작업시 피부 노출 최소화(작업복, 토시, 장갑 등 착용)
- 풀숲이 있는 곳과 접촉하지 않기
- 진드기 기피제 주기적 사용(4시간마다)
- 야외활동 후 귀가 즉시 목욕 및 작업복 분리세탁
- 야생 활동을 하는 개 등 동물과 접촉 주의(환자 발생)



야외활동 후 **증상**이 있을 때 **즉시!** 의료기관에서 진료받으세요!  
조기진단과 증상에 따른 **빠른 치료**가 무엇보다 중요합니다.

# 피부는 햇빛을 싫어하지만 진드기를 더 싫어합니다



## 예방 1 옷 제대로 입고



## 예방 2 기피제 뿌리고



## 예방 3 풀숲 피하고



## 예방 4 털고, 씻고, 빨래하고




# 야외활동 시 **진드기를 주의하세요!**


**진드기 예방 수칙 : 진드기와 접촉을 최대한 피해주세요.**



피부 노출을 최소화하기 위해  
**알맞은 복장 착용**



알맞은 복장 착용 후  
보조적으로 모기·진드기 기피제 사용



야외활동 후 몸에 진드기가 붙어 있는지  
꼼꼼하게 확인



야외활동 직후  
세탁과 목욕으로 진드기 제거

※ 진드기에 물렸을 때 무리해서 제거할 경우 염증이 생길 수 있으니 필요시 가까운 의료기관을 방문하세요.

**진드기 물렸을 때 대처 : 조기진단 · 적기치료가 가장 중요!**



야외 활동 후 감기 비슷한 증상이나 가피(검은 딱지)가 발견되면  
즉시 의료기관을 방문하여 꼭! 치료 받으세요.



**진드기 매개 감염병** 중증열성혈소판감소증후군(SFTS) | 프프가무시증 | 라임병  
세균 또는 바이러스를 가지고 있는 진드기가 원래 기생하던 들쥐나 야생동물 대신 사람 몸에  
우연히 붙어 물었을 때 발생할 수 있는 질환



질병관리본부



전라북도



군산시 보건소



전라북도 감염병관리지원단